

Lévothyroxine (Synthroid)

À quoi sert la lévothyroxine

À remplacer l'hormone thyroïdienne dans le traitement de l'hypothyroïdie.

Comment dois-je la prendre?

La lévothyroxine s'administre par la bouche. Prenez-la toujours de la même façon, au même moment chaque jour.

La lévothyroxine est plus efficace lorsqu'elle est administrée à jeun, une heure avant les repas ou deux heures après. Si vous éprouvez des maux d'estomac avec ce médicament, prenez-la avec de la nourriture.

Dose oubliée ou surdosage

Prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si le temps est presque venu de prendre la dose suivante, ne prenez pas celle que vous avez oubliée. Ne doublez pas la dose. Si vous oubliez deux doses ou plus, contactez votre médecin.

Effets secondaires

Lorsque le dosage est adéquat, les effets secondaires sont très rares.

Cessez de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin si vous présentez n'importe laquelle des réactions suivantes :

- vomissements ou diarrhée
- variation très marquée du poids
- transpiration très abondante
- insomnie, nervosité
- crampes ou douleurs musculaires, tremblements
- palpitations ou fréquence cardiaque élevée
- difficulté à respirer
- douleurs thoraciques
- maux de tête sévères
- éruptions cutanées et urticaire

Interactions médicamenteuses

Il existe des interactions avec certains médicaments y compris les médicaments en vente libre et les produits naturels. Consulter un pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

Conservation

Conserver à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans des contenants fermés hermétiquement.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.