

LH recombinante (Luveris)

Qu'est-ce que la LH recombinante?

La **LH** vous a été prescrite pour permettre la maturation des **follicules ovariens** en vue de l'ovulation.

La **LH**, appelée aussi hormone lutéinisante, est une hormone sécrétée par l'**hypophyse** (une glande située au niveau du cerveau).

Luveris est fabriqué par ingénierie génétique.

Mode d'utilisation

Luveris s'administre par injection sous-cutanée, **toujours à la même heure.**

Ce médicament sera fourni par l'infirmière de la clinique. Elle vous expliquera comment le préparer et comment vous l'injecter.

La dose de Luveris varie selon le protocole choisi et selon votre profil.

La durée de traitement varie selon votre réponse au traitement, soit la maturation de vos **follicules ovariens**.

Référez-vous au calendrier qui vous a été expliqué par l'infirmière pour connaître la dose que vous devez vous administrer ainsi que la durée du traitement.

Votre réponse au traitement est évaluée par des dosages hormonaux, faits par prises de sang, et des échographies.

Dose oubliée ou surdosage:

Contactez votre professionnel de santé du CPA

Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant.

En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait prescrit.

Effets secondaires

Luveris est généralement bien tolérée. Vous pourriez présenter des maux de tête, des crampes abdominales, de la sensibilité des seins, des bouffées de chaleur, des nausées, un gonflement abdominal, une rougeur au site d'injection qui persiste en général 24 heures. Parlez-en à votre professionnel de la santé s'ils vous incommode.

Ce traitement peut **rarement** entraîner un **syndrome d'hyperstimulation ovarienne** (SHO). Afin de le prévenir, un suivi étroit sera effectué. Toutefois, il est important de reconnaître les signes de gravité.

Contactez d'urgence votre médecin si vous ressentez :

-  **Douleur abdominale sévère.**
-  **Nausées, diarrhée, vomissements sévères.**
-  **Gain rapide de poids et augmentation importante du périmètre abdominal.**
-  **Essoufflement au repos ou difficultés respiratoire.**
-  **Diminution du volume des urines.**

Les grossesses multiples, la formation de kystes ovariens sont possibles. Un suivi échographique sera effectué afin de les prévenir.

Rarement, des caillots de sang dans les jambes peuvent survenir. Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, des facteurs de risques connus, parlez-en à votre médecin.

Interactions

Luveris ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Utilisez immédiatement la solution dès qu'elle est reconstituée. Jetez tout le matériel inutilisé.

Conserver à température ambiante inférieure à 25°C.

Mettre à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.