

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : rufinamide 40 mg/ml suspension orale (F)

Format : 120 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 362101

Stabilité 90 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
rufinamide 200 mg co	24 co	72 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-PLUS)	60 ml	180 ml
++véhicule pour suspension orale (ORA-SWEET-SF)	QS AD 120 ml	QS AD 360 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Protéger de la lumière

Mode de préparation :

- 1) Triturer au mortier-pilon le nombre de comprimés requis.
- 2) Ajouter une petite quantité d'Ora-Plus pour former une pâte homogène.
- 3) Ajouter géométriquement le reste d'Ora-Plus requis.
- 4) Compléter au volume final requis avec l'Ora-Sweet-SF
- 5) Embouteiller et étiqueter.

USAGES:

Antiépileptique.

NOTES:

Note: Ora-Blend = mélange moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

La formulation se fait avec moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet SF pour les patients en diète cétogène.

L'emploi de l'Ora-Blend comme véhicule serait aussi possible dans les mêmes conditions.

RÉFÉRENCE:

Hutchinson DJ, Liou Y, Best R, Zhao F. Stability of extemporaneously prepared rufinamide oral suspensions. Ann Pharmacother 2010;44:462-5.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension blanche rosée.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.