

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : valACYclovir 50 mg/mL so fab (F)
Format : 100 ml
Quantité : 3 bout

No produit : 360839
Stabilité : 21 jour(s)
réfrigérateur

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
valACYclovir 500 mg co	10 co	30 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 100 ml	QS AD 300 ml
++bouteille de VERRE ambrée	1 bout	3 bout
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Agiter bien. RÉFRIGÉRER.

Conserver à l'abri de la lumière.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés au mortier-pilon.
- 2) Ajouter géométriquement un peu d'Ora-Blend pour former une pâte homogène. ATTENTION: Cette étape est cruciale pour obtenir une bonne fluidité finale.
- 3) Ajouter géométriquement la quantité requise d'Ora-Blend.
- 4) Compléter au volume final.
- 5) Embouteiller et étiqueter.

USAGE:

Antiviral.

NOTES:

Peut également se faire dans les mêmes conditions en utilisant moitié- moitié Ora-Plus et Ora-Sweet ou Ora-Sweet SF au besoin.

Attention: la stabilité n'est pas garantie au delà du 21 jours de l'étude.

La référence du Pediatric Drug Formulations n'est pas fidèle à l'article d'origine car ne mentionne que l'Ora-Sweet comme véhicule.

Etude réalisée en bouteille ambrée.

RÉFÉRENCES:

Fish DN, Vidaurri VA, Deeter RG. Stability of valacyclovir hydrochloride in extemporaneously prepared oral liquids. Am J Health-Syst Pharm. 1999;56:1957-60.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension bleue, opaque

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.