

Methylprednisolone (Médrol)

Qu'est-ce que Médrol?

Médrol est un anti-inflammatoire de la famille des corticoïdes.

Il diminue l'inflammation qui survient parfois suite au [prélèvement d'ovules](#) et/ou lors du [transfert d'embryon](#). Il favorise ainsi l'[implantation de l'embryon](#) au niveau de votre [utérus](#).

Mode d'utilisation et conseils d'utilisation

Médrol s'administre **par la bouche**.

La dose journalière que vous devez prendre est **16 mg une fois par jour pendant cinq jours**, de préférence le matin, avec votre déjeuner.

Vous débuterez **le traitement le lendemain** du [prélèvement d'ovules](#) ou [du transfert d'embryon](#).

Médrol n'est pas utilisé dans toutes les situations cliniques.

Dose oubliée ou surdosage

En cas d'oubli, ne prenez pas de double dose. Prenez la dose dès que vous y pensez sinon prenez la dose suivante à l'horaire habituel.

En cas de surdosage, contactez l'infirmière de la clinique.

Effets secondaires

Ce traitement est de courte durée, vous ne devriez donc pas ressentir d'effets secondaires importants.

Toutefois, il se peut que vous ayez des douleurs d'estomac. Prenez votre médicament pendant le déjeuner.

Médrol peut également perturber votre sommeil, évitez de le prendre après seize heures.

Signalez à votre médecin ou votre pharmacien les effets indésirables qui vous incommode.

Interactions médicamenteuses

Il existe des interactions entre Médrol et des médicaments. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin avant de débuter tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Conservez votre traitement à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, dans un contenant fermé hermétiquement.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.