Prélèvement de selles pour calprotectine fécale

(marqueur d'inflammation spécifique à l'intestin)

Pour la validité du test : La prise régulière d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) de type naproxène, ibuprofène (ex : Advil®, Motrin®) et l'aspirine peut fausser les résultats. Il est recommandé de les interrompre au moins 2 semaines avant la collecte de selles, à moins d'avis contraire du médecin.

Avant de faire le prélèvement, il est important de contacter le centre de prélèvements où vous prévoyez remettre l'échantillon, car les envois sont effectués certains jours de la semaine uniquement vers le centre désigné de votre région : Hôpital Maisonneuve-Rosemont ou Hôpital de Sherbrooke. L'échantillon doit leur parvenir en 4 jours maximum.

Déposer les selles (environ la quantité de la taille d'un jaune d'œuf) dans un pot stérile vide en vente libre à la pharmacie.

Aller porter l'échantillon à votre centre de prélèvement la journée du prélèvement ou le lendemain au plus tard.

Conserver au frigo. **Ne pas congeler.**

Assurez-vous d'identifier le pot en inscrivant tous les renseignements suivants :

- Nom et prénom
- Date de naissance ou # assurance maladie
- Date ET heure de prélèvement

Inscrivez sur la requête : date et heure du prélèvement et « parents » dans la case « prélevé par ».