



INJECTION SOUS-CUTANÉE DE BUSÉRÉLINE (Supréfact^{MD})

Informations destinées à la clientèle

Qu'est-ce que le Buséreline?

L'objectif du traitement avec le Buséreline est de supprimer la sécrétion des hormones sexuelles dans le but d'obtenir un contrôle de votre cycle menstruel. Il se peut donc que vous ressentiez quelques effets secondaires.

Effets secondaires possibles:

- ◆ Maux de tête (vous pouvez prendre du Tyléno^{MD})
- ◆ Bouffées de chaleur
- ◆ Bouche sèche, peau sèche, sécheresse vaginale
- ◆ Diminution de la libido
- ◆ Humeur changeante
- ◆ Rougeur au site d'injection

PROCÉDURE

ÉTAPE 1 : Se laver les mains avec de l'eau et du savon.

ÉTAPE 2 : Matériel

- ◆ Seringue à insuline
- ◆ 2 tampons d'alcool
- ◆ Une fiole de Buséreline
- ◆ Mouchoir en papier
- ◆ Contenant pour jeter les aiguilles utilisées

ÉTAPE 3 : Préparation du médicament

- ◆ Enlever le capuchon de la bouteille. Nettoyer la membrane de caoutchouc à l'aide d'un tampon d'alcool. Laisser sécher 30 secondes.
- ◆ Prendre la seringue à insuline et tirer le piston jusqu'au chiffre 50 (50 unités) pour aspirer de l'air.
- ◆ Insérer l'aiguille dans la fiole par le caoutchouc et injecter cette quantité d'air dans la bouteille.
- ◆ Tout en laissant l'aiguille dans la fiole, inverser cette dernière à la verticale et ajuster le bout de l'aiguille pour qu'elle soit sous la surface de la solution.
- ◆ Aspirer la quantité requise de solution en tirant sur le piston de la seringue. (50 unités) et retirer l'aiguille de la fiole.
- ◆ Pousser doucement sur le piston pour enlever le surplus d'air.
- ◆ Recapuchonner la seringue.

ÉTAPE 4 : Administration du médicament

- ◆ Nettoyer le site d'injection avec un tampon d'alcool du centre vers l'extérieur et attendre que l'alcool sec (30 sec.).
- ◆ Enlever le capuchon de l'aiguille.
- ◆ Tenir la seringue comme si vous teniez un dard.
- ◆ Pincer la peau au site d'injection au niveau de l'abdomen et tout en tenant la seringue comme si c'était un dard, enfoncer l'aiguille dans la peau d'un mouvement sûr et rapide. Injecter la solution tranquillement. Il est possible d'avoir une légère sensation de brûlure.
- ◆ Après avoir terminé l'injection, laisser l'aiguille en place pour environ 5 secondes avant de la retirer. Appuyer avec un mouchoir propre sur le site d'injection.

L'injection doit être administrée à la même heure chaque jour.