

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : sucralfate 6.7% cr fab (F)(G)
Format : 30 G
Quantité : 3 pot

No produit : 360832
Stabilité : 90 jour(s)
température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
sucralfate 1 g co	2 co	6 co
++glycerine liq	1 ml	3 ml
++base dermatologique cr	QS AD 30 G	QS AD 90 G
++magistrale catégorie UN HSJ	0	0

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Usage externe seulement.

Mode de préparation :

- 1) Compter le nombre de comprimés requis.
- 2) Compléter au poids requis avec la base dermatologique en tenant compte de la masse de la glycérine.
- 3) Broyer les comprimés.
- 4) Mouiller la poudre avec un peu de glycérine.
- 5) Incorporer cette pâte à la base dermatologique.

USAGE:

Traitement des douleurs et gercures des mamelons

NOTE:

Selon demande de l'équipe des pharmaciennes d'obstétrique-gynécologie.

RÉFÉRENCE:

Beaulac-Baillargeon L, Fournier M, Racine MC, Proulx E. Comparaison de l'effet du sucralfate et de la lanoline versus un placebo dans la prévention des douleurs et gercures aux mamelons au moment de l'allaitement maternel. *Pharmactuel* 2008;41,1:13-18.

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Crème blanche épaisse.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.