

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : cholestyramine 5% ong fab (léger)(F)(G)

Format : 80 G

Quantité : 3 pot

No produit : 360713

Stabilité 180 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
++cholestyramine (léger) 4g/5g poudre sachet	1 sachet	3 sachet
++eucerine anhydre ong	37.5 g	112.5 g
++eau irrigation	37.5 ml	112.5 ml
++magistrale catégorie DEUX HSJ	0	0

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Mode de préparation :

ATTENTION: UTILISER LA CHOLESTYRAMINE LÉGÈRE et non régulière.

- 1) Peser la quantité requise de poudre de cholestyramine légère OU ajouter un sachet de 5 grammes total de poudre de cholestyramine pour chaque 80 grammes à préparer.
- 2) Peser la quantité requise d'Eucerine ou l'Aquaphor.
- 3) Au mortier, diluer la poudre dans l'eau.
- 4) Au besoin, chauffer légèrement l'Eucerine ou l'Aquaphor au micro-ondes (90 secondes à 2 minutes à la fois) et y incorporer par dilution géométrique la solution de cholestyramine.
- 5) Empoter et étiqueter.

USAGES:

Traitement de l'irritation au pautour d'une plaie.

NOTES:

Un sachet de poudre de cholestyramine légère contient 4 grammes de résine pour 5 grammes au total. La concentration est en fonction de la masse de résine.

La recette recue du Children's Hospital d'Eastern Ontario comportait des divergences par rapport à l'article original, soit la concentration finale légèrement différente et la mention de réfrigération qui n'est pas requise.

Cette formulation remplace l'ancienne à 8.9% (20% de Questran) à la demande de Mme Louise Forest-Lalande, stomatothérapeute en août 2010.

La stabilité est basée sur l'expérience personnelle des auteurs de la référence (White et al). Aucune donnée formelle de stabilité n'est disponible.

RÉFÉRENCE:

White CM, Gailey RA, Lippe S. Cholestyramine ointment to treat buttocks rash and anal excoriation in an infant. Ann Pharmacother 1996;30(9):954-6.

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: jaunâtre, homogène, gromuleux, ferme

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.