

Acide acétylsalicylique (Aspirine) - 80 mg et 81 mg par comprimé

Qu'est-ce que l'aspirine ?

L'aspirine favorise [l'implantation de l'embryon](#) au niveau de l'[utérus](#) suite au [transfert d'embryon](#). Ce médicament améliore votre flux sanguin utérin.

Mode d'utilisation et conseils

Votre médecin vous prescrira ce médicament à faibles doses soit 81 mg par jour, une fois par jour, de préférence au coucher.

Vous débuterez le traitement 24 heures après le transfert d'embryon si vous ne présentez pas de saignements.

Il est également possible que vous preniez ce médicament suite à des [fausses couches](#) à répétition. La dose peut alors parfois varier, suivez les consignes de votre médecin.

Dose oubliée ou surdosage

En cas d'oubli, ne prenez pas de double dose. Prenez la dose dès que vous y pensez sinon prenez la dose suivante au moment habituel.

En cas de surdosage, contactez l'infirmière de la clinique.

Effets secondaires

Les effets secondaires de l'aspirine à de faibles doses sont minimes. Toutefois, il se peut que vous ayez des saignements, des contusions (« bleus »). Il se peut également que vous ayez des troubles digestifs et notamment des brûlures d'estomac.

Signalez à votre médecin si vous êtes à risque de saigner (maladie liée aux facteurs de coagulation) ou si vous avez observé des saignements avant la prise de ce médicament. Assurez-vous de l'absence de sang dans les selles (selles noires).

Contactez votre médecin en cas de saignements importants.

Signalez à votre médecin, si vous faites des allergies ou de l'asthme, car la prise d'aspirine peut déclencher ou aggraver vos crises d'asthme ou d'urticaire.

Signalez à votre médecin si vous avez eu des réactions d'hypersensibilité par le passé suite à la prise d'aspirine.

Interactions médicamenteuses

Certaines associations avec l'aspirine ou les anti-inflammatoires peuvent augmenter les douleurs d'estomac. Toutefois, dans le cadre de votre prise en charge et pour favoriser l'implantation de l'embryon, il se peut que votre médecin choisisse d'associer ces médicaments. Les bénéfices sont incontestables, n'arrêtez pas votre traitement sans en parler avec votre médecin.

Des interactions avec d'autres médicaments et des produits de santé naturels sont possibles. Demandez conseils à votre pharmacien ou à votre médecin avant de débuter tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Conserver à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans des contenants fermés hermétiquement.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.