

## Gonadotrophine chorionique recombinante (Ovidrel)

### Qu'est-ce qu'Ovidrel?

Ovidrel contient l'**hCG** (**hormone gonadotrophine chorionique**), une hormone habituellement produite par le **placenta**.

Elle permet de contrôler le **déclenchement de l'ovulation**.

La gonadotrophine chorionique recombinante est fabriquée par ingénierie génétique.

### Mode d'utilisation

Ovidrel s'administre par injection **sous-cutanée le soir**, en une **dose unique de 250 µg, à heure exacte**.

L'infirmière de la clinique vous enseignera comment préparer votre médicament et comment l'injecter.

**Elle communiquera également avec vous pour vous indiquer le moment exact où vous devrez vous administrer Ovidrel<sup>md</sup>.**

### Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPA

Si vous oubliez ou manquez la dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant.

En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait précisé.

### Effets secondaires

**Ovidrel est généralement bien tolérée.**

Vous pouvez présenter des maux de tête, des crampes abdominales, de la sensibilité des seins, des bouffées de chaleur, des nausées, un gonflement abdominal, une rougeur au site d'injection qui persiste en général 24 heures. Parlez-en à votre professionnel de la santé s'ils vous incommode.

Ce traitement peut rarement entraîner un **syndrome d'hyperstimulation ovarienne** (SHO). Afin de le prévenir, un suivi étroit sera effectué. Toutefois, il est important de reconnaître **les signes de gravité**.

**Contactez d'urgence votre médecin si vous ressentez :**

-  **Douleur abdominale sévère.**
-  **Nausées, diarrhées, vomissements sévères.**
-  **Gain de poids rapide et augmentation importante du périmètre abdominal.**
-  **Essoufflement au repos ou difficultés respiratoire.**
-  **Diminution du volume des urines.**

Les grossesses multiples et la formation de kystes ovariens sont possibles. Un suivi échographique sera effectué afin de les prévenir.

Rarement, des caillots dans les jambes peuvent survenir. Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, des facteurs de risques connus, parlez-en à votre médecin.

### Interactions

Ovidrel ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

### Conservation

Conserver dans son emballage original.

Mettre à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.

-  Les seringues pré-remplies doivent être conservées à une température de 2 à 8 °C (dans un réfrigérateur).
-  Les fioles sont stables lorsqu'elles sont conservées à une température ambiante ne dépassant pas 25 °C.