

POMPE À INSULINE: L'HYPERGLYCÉMIE (glycémie ≥ 15) CONSEILS POUR L'ÉCOLE ET LA GARDERIE

Aussi disponible sur notre site Web à cette adresse :

<http://www.jeunediabete.com/intervenants-scolaires/hyperglycemie/>

CAUSES :

- Repas/collation sans insuline
- Discordance glucides/insuline
- Oubli d'insuline
- Maladie, fièvre, stress
- Moins d'activité qu'à l'habitude
- Alarme/problème technique de la pompe

SYMPTÔMES :

- Bouche sèche
- Soif excessive
- Besoin fréquent d'uriner
- Vision trouble
- Fatigue
- _____
- _____
- _____

TRAITEMENT

1. Vérifier les corps cétoniques dans le sang ou l'urine :
(si matériel disponible)

Si cétone sanguin < 0,6

Répéter la glycémie dans 4 heures et test des corps cétoniques au besoin.

Si cétone sanguin 0,6-1,4

Appeler les parents et suivre leurs conseils.

Si cétone sanguin $\geq 1,5$

Les parents doivent venir chercher l'enfant.

2. **Dans l'impossibilité de vérifier les corps cétoniques**, aviser les parents sans attendre si la glycémie ≥ 15.0 **ET** si présence de nausées et/ou vomissements et/ou douleur abdominale.

3. Permettre à l'enfant de boire de l'eau et d'aller aux toilettes.

Prénom, Nom

Titre

Date

