

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : flecainide 20 mg/mL so fab (F)
Format : 30 ml
Quantité : 1 bout

No produit : 361136
Stabilité : 60 jour(s)
température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
flecainide 100 mg co	6 co	6 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 30 ml	QS AD 30 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu de d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend et bien mélanger.

USAGE:
Antiarythmique

NOTES:
Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.
Stable également 60 jours réfrigéré
Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.

RÉFÉRENCES:

Allen BV et al. Stability of baclofen, captopril, diltiazem HCl, dipyridamole, and flécaïnide acetate in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1996;53:2179-84.
Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

APPARENCE ET CONTRÔLE QUALITÉ:

Aspect: suspension blanche, pâle, trouble.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.