

Tamoxifène (Nolvadex)**Qu'est-ce que le tamoxifène?**

Le tamoxifène stimule les [ovaires](#) à produire des [ovules](#) matures pour la [fécondation](#).

Il aide l'[hypothalamus](#) (une glande située dans le cerveau) à libérer les hormones impliquées dans le [cycle ovulatoire](#), la [GnRH](#), la [FSH](#) et la [LH](#). Ces hormones participent au recrutement et à la maturation des [follicules](#) ovariens. L'un de ces follicules contiendra l'ovule pour la [fécondation](#).

Mode d'utilisation

Prenez ce médicament comme il est indiqué sur votre calendrier, toujours à la même heure chaque jour.

L'ovulation devrait survenir de 6 à 12 jours après la prise de votre dernier comprimé durant un cycle.









La dose de tamoxifène peut varier d'un cycle à l'autre, selon la réponse au traitement. L'augmentation de dose nécessite un suivi étroit, n'augmentez pas la dose par vous-même.

Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPA




Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant. En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait prescrit.

Effets secondaires

Les effets secondaires possibles sont les suivants. Parlez-en à votre professionnel de la santé s'ils vous incommode :

-  Bouffées de chaleur.
-  Sensibilité des seins.
-  Écoulements vaginaux et prurit vulvaire
-  Vertiges, étourdissements.
-  Maux de tête.
-  Gain de poids.
-  Nervosité ou troubles du sommeil.
-  Inconfort abdominal/pelvien, ballonnements.

Les effets secondaires suivants sont **très rares**, contactez votre médecin s'ils surviennent :

-  Douleur au bas-ventre sévère.
-  Nausées, vomissements sévères.
-  Troubles visuels

Les grossesses multiples et la formation de kystes ovariens sont possibles. Un suivi échographique sera effectué afin de les prévenir.

Interactions

Le tamoxifène présente des interactions avec d'autres médicaments, notamment avec certains antidépresseurs et des anticoagulants ainsi que des produits de santé naturels tels que le millepertuis. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Conserver à température ambiante (maximum 25 °C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans des contenants fermés hermétiquement.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.