

Buséreline (Suprefact)

Qu'est-ce que Suprefact?

Suprefact permet d'obtenir un meilleur contrôle de votre cycle. Ainsi, il favorise une meilleure maturation de vos [follicules ovariens](#).

Suprefact mime l'action de la [GnRH](#), une hormone nécessaire au bon fonctionnement du cycle ovarien.

Après l'administration de plusieurs doses, Suprefact empêche la libération de [FSH](#) et de [LH](#) par votre [hypophyse](#) (glande située au niveau du cerveau).

Mode d'utilisation

Deux modes d'administration de Suprefact existent soit par **injection sous-cutanée** ou par **solution nasale**.

Votre infirmière vous expliquera comment préparer votre médicament et comment l'administrer. Elle vous remettra également un feuillet [conseils d'administration pour l'injection sous-cutanée](#) ou [conseil d'administration nasale](#).

La dose de Suprefact varie selon le protocole choisi. La durée de traitement varie selon votre réponse au traitement, soit la maturation de vos [follicules ovariens](#).

Votre réponse au traitement est évaluée par des dosages hormonaux, faits par prises de sang, et des échographies.

Référez-vous au calendrier qui vous a été expliqué par l'infirmière pour connaître la dose que vous devez vous administrer ainsi que la durée de traitement.

Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPA

Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant.

En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait prescrit.

Effets secondaires

Suprefact est généralement bien toléré. Toutefois, vous pourriez présenter les effets suivants :

-  maux de tête, crampes abdominales, bouffées de chaleur, nausées, humeur changeantes, nervosité, fatigue, saignements vaginaux, sécheresse vaginale ou rougeur au site d'injection.

Parlez-en à votre infirmière de la clinique, votre médecin ou votre pharmacien si ces effets vous incommode.

Interactions

Ce médicament ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Conservez le produit à une température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

La solution pour injection peut être conservée à une température ambiante pendant 14 jours suivant son ouverture.

Vous pouvez conserver la solution nasale, un mois après ouverture.

Gardez hors de la portée des enfants.