

Plan vaccinal

Le plan vaccinal qui vous sera présenté comportera plusieurs vaccins (entre 5 et 15) qui devront être administrés sur plusieurs visites. Pour la majorité des patients, la vaccination sera prise en charge au CHU Sainte-Justine.

Mesures pour atténuer la douleur et l'anxiété

La douleur et l'anxiété liées à la vaccination est une réalité, particulièrement chez les enfants qui ont été exposés à de multiples épreuves douloureuses à travers leurs traitements antérieurs. Des mesures d'atténuation de la douleur et d'anxiété vous seront proposées.

Mesures d'atténuation de la douleur et l'anxiété

Positionnement, Distraction, Allaitement, Sucrose, Crème anesthésique topique, Jet refroidissant, Injections simultanées
www.chusj.org/toutdoux

Vaccination de la famille

La mise à jour de la vaccination des autres membres de la famille et de l'entourage immédiat est fortement recommandée afin de s'assurer que ceux-ci ne transmettent pas de MEV

Pour plus d'informations

S'il y a des questions ou des inquiétudes auxquelles ce dépliant n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter.

Clinique de maladies infectieuses
(514) 345-4931 poste 3937

Notes complémentaires

Photos page couverture

Images www.docteurcllic.com
Enfant : Marc-Olivier, 14 ans, greffé rénale

Auteur :

Denis Blais, Inf. clin. Maladies infectieuses


Collaborateurs :

Dr Bruce Tapiero, infectiologue
Stéphanie Dion, inf. clin. Greffe hépatique
Jean-Philippe Marcoux, inf. clin. Greffe rénale

CHU Sainte-Justine

Approbation comité des nouveaux dépliants
Janvier 2024

LA VACCINATION CHEZ LES ENFANTS GREFFÉS D'ORGANE SOLIDE




CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant
Pour l'amour des enfants


Université
de Montréal

Services des
Maladies Infectieuses

Ce dépliant d'information traite de la vaccination chez les enfants en attente ou ayant eu une greffe d'organe solide (foie, rein ou cœur).

La vaccination AVANT la greffe d'organe solide

Votre enfant présente une condition médicale chronique qui nécessitera une greffe d'organe solide (GOS) prochainement. Le principe est simple avant une greffe : on poursuit la vaccination selon le calendrier vaccinal de base en priorisant les vaccins vivants atténués et en ajoutant des vaccins supplémentaires contre certaines maladies fréquentes (infection à pneumocoque et méningocoque, grippe ou influenza, COVID-19).

Le professionnel de la santé évaluera le statut vaccinal de l'enfant à l'aide de plusieurs paramètres : les vaccins reçus antérieurement, le type de condition médicale et les tests de laboratoire servant à mesurer la protection immunitaire contre plusieurs maladies (aussi appelé sérologie vaccinale).



Québec 

Source : ministère santé services sociaux

Le dépistage de la tuberculose

En prévision de la future greffe et selon les facteurs de risque, plusieurs enfants devront faire un test de dépistage de la tuberculose, appelé test cutané tuberculinique (TCT ou anciennement appelé PPD).



Source : CHU Sainte-Justine

Le TCT se fait en deux (2) étapes :

- **Étape 1** : Ce test consiste en une petite injection superficielle sur la peau au niveau de l'avant-bras. Une papule au site d'injection sera formée.
- **Étape 2** : Une lecture et évaluation du test est requise par un professionnel de la santé 2 à 3 jours (48 à 72 heures) après l'injection du TCT.

Une immunosuppression à vie

Les enfants greffés d'organe solide ont une particularité : ils devront prendre des médicaments immunosuppresseurs durant toute leur vie afin d'empêcher le rejet de leur greffon, les rendant ainsi vulnérables aux infections. Dans ce contexte, il sera important de les protéger adéquatement contre les maladies évitables par la vaccination (MEV).

La vaccination APRÈS la greffe organe solide

Après la GOS, le système immunitaire récupère progressivement, avec un niveau stable d'immunosuppression après une période d'environ 6 mois chez la majorité des patients.

À ce stade-ci, on doit procéder à un rappel systématique de certains vaccins et poursuivre la vaccination selon un calendrier modifié en raison de l'immunosuppression liée à la greffe d'organe solide.

Vaccination recommandée APRÈS une greffe d'organe solide*
Vaccins inactivés Diphtérie, Coqueluche, Tétanos Poliomyélite, Haemophilus influenza B Pneumocoque, Méningocoque Hépatite A, Hépatite B, Virus Papillome Humain, Influenza injectable, COVID-19
* Exception pour le vaccin contre la Varicelle qui pourra être administré selon des critères précis et sur avis médical seulement
Vaccination Contre-Indiquée APRÈS une greffe organe solide
Vaccins vivants atténués Rotavirus, Rougeole, Rubéole, Oreillons, Influenza intra-nasale
Certains vaccins voyages tel que la Fièvre jaune, BCG et Typhoïde oral