

La fièvre et l'anémie falciforme

Dépliant d'information à l'intention des parents



Votre enfant a l'anémie falciforme. Il semble faire de la fièvre.

Que faire si mon enfant a de la fièvre ?

La fièvre est souvent l'un des premiers signes d'une infection.

Chez un enfant avec anémie falciforme, il est important de consulter rapidement s'il a de la fièvre, afin d'éliminer la possibilité d'une infection grave.

Consultez votre médecin à la clinique d'hématologie, de jour en semaine, ou sinon à l'urgence. Ceci est une urgence !

Un enfant avec anémie falciforme est à risque d'infections.

Les enfants avec anémie falciforme présentent un plus grand risque d'avoir des infections graves. C'est pour cette raison que vous devez consulter rapidement.


L'infirmière et le médecin qui évalueront votre enfant chercheront les infections les plus à risque pour lui.

Ceci inclut :

- Une infection des poumons (pneumonie) ;
- Une infection de sang (bactériémie) ;
- Une infection urinaire ;
- Une infection des os (ostéomyélite) ;
- Une méningite ;
- Une infection virale comme la grippe.

Pourquoi plus d'infections ?

Les enfants avec anémie falciforme ont une rate qui ne fonctionne pas bien. La rate est un organe qui permet de protéger contre plusieurs infections bactériennes responsables de pneumonies et d'infections du sang.



<https://www.mayoclinic.org>
Utilisé avec la permission de la Fondation
Mayo pour l'éducation médicale
et la recherche, tous droits réservés

Qu'est-ce que la fièvre ?

Une température de 38,5°C ou plus rectale ou 38,0°C ou plus buccale est considérée de la fièvre. Il est important d'utiliser un thermomètre et que les personnes qui s'occupent de votre enfant sachent bien l'utiliser. Chez les enfants de moins de 5 ans, la prise de température rectale est préférable. La température axillaire (sous le bras), auriculaire (dans l'oreille) ou frontale ne sont pas des mesures suffisamment précises et sont à éviter.



Tiré de :
<https://www.wikihow.com/Measure-Temperature>

Avant de venir à l'hôpital

Soyez prêt ! Ayez un petit sac rempli de quelques effets personnels prêt à emporter pour quitter rapidement la maison lorsque vous devez vous rendre à l'hôpital. Ajoutez-y quelques jouets favoris de votre enfant qui pourront le distraire pendant les tests qui seront faits à l'hôpital. Demandez à votre médecin de vous prescrire de la crème analgésique, que vous pourrez appliquer 30 minutes avant les prises de sang de votre enfant si le temps le permet. Appliquez la taille d'un 25 sous sur la grosse veine dans le pli du coude et sur le dos de sa main, tel que montré ci-dessous (sous l'annulaire). Recouvrir d'une pellicule plastique ou d'un tegaderm^{MD}.



Que se passera-t-il à l'hôpital ?

Afin de s'assurer que votre enfant ne présente pas une infection grave, l'infirmière et le médecin qui le soigneront lui feront une prise de sang et une radiographie pulmonaire. Certains enfants et adolescents auront aussi un test d'urine et un test sur les sécrétions du nez.

Votre enfant recevra également une première dose d'antibiotique intraveineux. Le premier antibiotique donné est souvent la ceftriaxone. Votre enfant devra être en observation pour une période de deux heures à la suite de la prise de cet antibiotique. Il faudra aussi attendre les résultats des prises de sang et de la radiographie.

Pourra-t-on retourner à la maison ?

À la suite de l'évaluation de l'infirmière et du médecin, on décidera si votre enfant peut retourner à la maison ou s'il doit être admis à l'hôpital. Pour retourner à la maison, il faut que votre enfant ait plus de 6 mois, soit en bon état général, fasse moins de 40 °C de température et qu'il n'ait pas fait de réaction à l'antibiotique. Cela dépendra également de ses antécédents, de son examen physique, de ses prises de sang et de sa radiographie pulmonaire.



Mon rôle à l'hôpital

Dès votre arrivée à l'hôpital, avisez le personnel soignant que votre enfant a l'anémie falciforme. L'infirmière et le médecin feront l'évaluation et les tests nécessaires.

À tout moment, si l'état de santé de votre enfant se détériore ou si votre enfant est en mauvais état pendant qu'il est à l'hôpital, avisez rapidement l'infirmière et le médecin.

Ceci inclut s'il a mal dans la poitrine, a de la difficulté à respirer ou à s'éveiller, s'il a très mal au ventre ou à la tête, s'il a des vomissements. Soyez attentif à ces symptômes lorsque l'antibiotique est donné à votre enfant.

CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec) H3T 1C5

Téléphone : 514 345-4931

chusj.org

Retour à la maison

Si votre enfant obtient son congé à la maison, vous devez surveiller son état.

Il est important de consulter rapidement de nouveau si votre enfant :

- Est en mauvais état, est moche
- A de la douleur dans la poitrine, respire vite ou a de la difficulté à respirer ;
- Est somnolent ;
- A de fortes douleurs ;
- A des urines noires ;
- A une augmentation de la taille de sa rate ;
- A une éruption cutanée.

Faites le suivi prévu avec son infirmière d'hématologie au 514 345-4931, poste 2476 en semaine, ou poste 2111 la fin de semaine et les jours fériés.

Collaborateurs

Dre ED.Trottier (urgence), Dr Y Pastore (hématologie),
Dre N Robitaille (hématologie), N Fournier (hématologie),
M St-Onge Bégin (hématologie), Dre N Gaucher (urgence),
Dr B Bailey (urgence), Dre N Kleiber (pédiatrie),
Dre MJ Doré-Bergeron (pédiatrie), A Viau (pharmacie),
J Darilus (parent partenaire).

Graphisme

Norman Hogue

Impression

Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine

Comité des dépliants destinés à la clientèle du CHU Sainte-Justine

F-1642 GRM30011033 (rév. 07-2020)