

Incubation : 5 à 21 jours (avec une moyenne de 8 à 12) jusqu'à l'apparition des premiers symptômes

Saisons : Hiver et printemps

Personnes à risque : Nourrissons et adolescents (vaccination absente ou incomplète)



Contagiosité : 4 jours avant et jusqu'à 4 jours suivant le début de l'éruption

Éviction scolaire d'au moins 4 jours après le début de l'éruption

- Malaise général, abattement, irritabilité
- Fièvre élevée
- Rhinorrhée, toux
- Yeux rouges et larmoyants
- Éruption cutanée maculopapulaire

Signe particulier : Taches de Koplik

Peut être confondue avec : maladie de Kawasaki, scarlatine, autre éruption virale, toxidermie, allergie

Évolution : Guérison en une dizaine de jours

Facteurs de risque : premiers 12 mois de vie, déficits immunitaires, malnutrition, grossesse

Risque embryo-fœtal : Faible risque de maladie congénitale

Éruption maculo-papuleuse :

- Éruption cutanée généralisée non prurigineuse débutant au niveau de la tête puis envahissant le tronc et les membres
- Éléments maculo-papuleux rouges espacés de peau saine
- Érythème des muqueuses bucco-pharyngées; dépôts blanchâtres à la face interne des joues (taches de Koplik)

Traitement symptomatique : Vitamine A si dénutrition

Prévention :

- **Contacts réceptifs** : gammaglobulines IM pour les moins de 30 kg sinon gammaglobulines IV
- **Entourage** : vaccination des sujets réceptifs

Grossesse : Faible risque embryo-fœtal mais risque de rougeole grave chez la mère.


Examens paracliniques :

Pour confirmation diagnostique ou à des fins épidémiologiques : PCR rougeole sur sécrétions nasopharyngées et/ou urine et détection des anticorps spécifiques (IgG et IgM dans le sang). Une leucopénie est habituelle pendant la période fébrile en l'absence de surinfection bactérienne

Complications :

- Otite moyenne aiguë, convulsion fébrile, diarrhée
- Pneumonie bactérienne, pneumonie interstitielle, laryngo-trachéo-bronchite
- Encéphalite aiguë (1 sur 1000 cas de rougeole)
- Panencéphalite sclérosante subaiguë (complication rare et tardive, non contagieuse; incubation moyenne de 10 ans)
- Décès par complication pulmonaire ou neurologique (1 sur 3000 cas de rougeole)

Taches de Koplik



Éruption maculo-papuleuse

Éruption généralisée d'éléments maculo-papuleux rouges; éruption non prurigineuse débutant au niveau du front et des régions rétro-auriculaires, s'étendant au tronc et aux membres puis s'effaçant en 5 à 6 jours avec brunissement et desquamation furfuracée de la peau.

Enanthème :

- Érythème des muqueuses bucco-pharyngées; dépôts blanchâtres à la face interne des joues (taches de Koplik); parfois vésicules au niveau du palais mou.
- Conjonctives hyperémiées avec larmoiement et photophobie.